



Odra/Kip/Measles



Czym jest odra ?

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Objawy pojawiają się w ciągu 10 do 12 dni od zakażenia i początkowo przypominają przeziębienie. W miarę rozwoju choroby, temperatura rośnie i może dochodzić do 41°C, a na ciele pojawia się czerwona wysypka.

Jak bardzo zakaźna jest odra ?

Chory na odrę zakaża średnio **12-18** nieodpornionych osób. Odra jest bardziej zakaźna od grypy, świnki, a nawet ospy wietrznej.



Powikłania

Powikłania po odrze są bardzo powszechne i dotyczą 30 % zachorowań



U 7-9 % chorych występuje zapalenie ucha środkowego



Biegunka pojawia się u 8 % chorych



Zapalenie płuc dotyczy 1 – 6 % chorych



U 1 na 1000 osób pojawia się zapalenie mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych. W rzadkich przypadkach może dojść do podostrego stwardniającego zapalenia mózgu, nawet kilka, kilkanaście lat po zakażeniu

Zapobieganie

Najlepszą metodą zapobiegania zachorowaniom są szczepienia ochronne. Program szczepień ochronnych w Polsce przewiduje obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko odrze w 2 roku życia oraz w ramach dawki przypominającej w 10 roku życia (od 2019 r. w 6 r.ż.). Obowiązek dotyczy szczepień wszystkich dzieci przebywających w Polsce > 3 miesięcy. Szczepienia oraz badanie kwalifikacyjne są NIEODPŁATNE zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Co zrobić po kontakcie z chorym ?

Osoby nieszczepione, jak również osoby uodpornione tylko 1 dawką szczepionki, które miały kontakt z chorym powinny w ramach profilaktyki zostać zaszczepione w przeciągu 72 godzin.

Odra to poważna choroba




Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Objawy pojawiają się w ciągu 10 do 12 dni od zakażenia i początkowo przypominają przeziębienie. W miarę rozwoju choroby, temperatura rośnie i może dochodzić do 41°C, a na ciele pojawia się czerwona wysypka.

W ok. 30 % zachorowań występuje jedno lub więcej powikłań. Powikłania są stwierdzane głównie u dzieci poniżej 5 roku życia i u osób powyżej 20 lat.


Powikłania po zachorowaniu na odrę



Zapalenie ucha środkowego, które może prowadzić do utraty słuchu występuje u 7-9 % dzieci



Biegunka występuje u 8 % chorych



Zapalenie płuc pojawia się u 1 do 6 % chorych




Zapalenie mózgu mogące prowadzić do głuchoty lub niesprawności umysłowej rozwija się u 1 na 1000 osób




Uszkodzenie rogówki oka, mogące prowadzić do ślepoty dotyczy zwłaszcza dzieci niedożywionych z niedoborem witaminy A



Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) jest rzadkie ale może wystąpić nawet kilkanaście lat po zakażeniu.



1 na 4 osób chorych na odrę wymaga **hospitalizacji.**



1 osoba na 1000 chorych na odrę **umiera**

Zródło: ECDC. Measles and rubella elimination: Communicating the importance of vaccination. Stockholm: ECDC, 2014. Available at: ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Measles-rubella-elimination-communicating-importance-vaccination.pdf

www.ecdc.europa.eu

Szczepienie przeciw odrze chroni Ciebie i Twoją rodzinę. Poprzez szczepienie przyczyniasz się też do zwiększenia odporności zbiorowej.

